

예방접종 후 이상반응에 대한 안내



이럴 땐, 이렇게 하세요.

- 예방접종 후 접종부위 부기·통증이 있는 경우, 깨끗한 마른 수건을 대고 그 위에 냉찜질을 하세요.
 - 미열이 있는 경우, 수분을 충분히 섭취하고 휴식을 취하세요.
 - 발열이나 근육통 등으로 불편함이 있는 경우, 해열·진통제를 복용하시면 도움이 됩니다.
- * 예방접종 전에 미리 아세트아미노펜 성분의 해열·진통제를 준비하고, 예방접종 후 몸살 증상이 있으면 해열·진통제를 복용하세요.



이럴 땐, 의사 진료를 받으세요.

- 예방접종 후 발열, 몸살, 두통 등의 증상이 2일 이상 지속되는 경우
- 발열, 몸살, 두통 등의 증상이 해열·진통제를 복용해도 호전되지 않거나 악화되는 경우
- 갑자기 기운이 떨어지거나 평소와 다른 이상 증상이 나타난 경우
- 접종부위가 아닌 곳에서 멍이나 출혈이 생긴 경우



이럴 땐, 119에 신고 또는 응급실을 방문하세요.

- 예방접종 후 숨쉬기 곤란하거나 심하게 어지러운 경우
- 입술, 얼굴이 붓거나 온몸에 심한 두드러기 증상이 나타나는 경우
- 갑자기 의식이 없거나 쓰러진 경우