

6개월~4세

영유아 코로나19 예방접종의 모든 것

적극 권고되는
고위험군은
어떤 아이들인가요?

누가, 어떻게
맞는거죠?







누가, 어떻게 맞는 건가요?

6개월~4세의 영유아 대상이며,
고위험군의 경우 적극 권고하고 있습니다.

접종백신 : 영유아용 화이자백신
접종간격 : 8주(56일) 간격 3회 접종






6개월~4세도 접종해야 하는 이유가 있나요?

영유아는 큰 아이들보다 입원율과 치명률이 높아 상대적으로 더 위험합니다.




영유아·소아청소년의 코로나19 누적치명률



*(2020.1월~2023.1월 2주)

영유아·소아청소년의 연령대별 코로나19 입원율



*(22년 11월 - 12월) 17세 이하 확진자 중 입원환자 비율





특히, 고위험군 영유아에게 접종이 필요한 이유가 있나요?

기저질환을 보유한 경우
중증·사망 위험이 높기 때문에 접종이 필요합니다.

 **접종이 필요한 고위험군 영유아는 다음과 같습니다.**

- 심각한 면역저하자, 만성폐질환, 만성심장질환, 중증 뇌성마비, 다운증후군 등
- 이외에도 접종이 필요하다고 판단되는 경우, 의사소견에 따라 접종 권고





아이들에게도 안전한가요?

영유아용 화이자백신은
우리나라의 **식약처, 미국 FDA, 유럽 EMA**의
안전성 검증을 거친 백신이며,
미국, 싱가포르, 일본, 이스라엘에서도
6개월 이상의 영유아에게 접종을
시행하고 있습니다.





해외에서 검증된 안전성

영유아 코로나19 예방접종을 실시하고 있는 다른 나라에서도 **이상사례 보고율이 낮은 수준**이었고,

※ (캐나다) 접종 1,000건당 0.48건, (대만) 접종 1,000건당 0.09건

미국에서 이상 사례에 대해 조사한 결과,
대부분은 일반적인 증상이었습니다.

(6개월~2세) 보챔, 졸려함, 발열, 통증, 식욕부진 등

(3세~4세) 주사부위 통증, 피로, 발열 등



6개월~4세

영유아 코로나19 위험

예방접종으로 막을 수 있습니다

영유아는 **증상발생 또는 진단일부터 사망까지 기간이 매우 짧아**
적기에 적절한 의료조치가 어려울 수 있으므로
예방접종이 더욱 중요합니다.

