



코로나19 후유증

조사 결과를 알려드립니다



코로나19 후유증이란?

코로나19에 확진된 후 새롭게 생긴 증상이
4주 이상 지속된 경우를 말합니다.



Q. 만성 코로나19증후군과는 어떻게 다른가요?

A. 만성 코로나19증후군은 코로나19 확진 후 새롭게 생긴 증상이 12주 이상 지속되는 경우를 뜻합니다.

* 국가 및 기관별로 정의에 차이가 있음. [질병관리청 홍보자료 참고(만성 코로나19 증후군 안내문)]

언제, 어떻게 조사했나요?

2022년 국가건강조사*에 **코로나19 확진 후 4주 이상 지속되는 증상**에 대한 내용을 추가하여 조사하였습니다.

***국가건강조사**

(국민건강영양조사) '22. 6. 8. ~ 12. 22, 만1세 이상 총 3,915명

(지역사회건강조사) '22. 8. 16. ~ 11. 7, 만19세 이상 총 231,785명



어떤 내용을 조사했나요?

코로나19 확진 후 4주 이상 증상 경험,
주된 증상 종류, 치료 경험, 일상생활 지장 여부
등에 대해 조사하였습니다.

코로나19 확진으로 인해
새롭게 생긴 증상이
4주 이상 지속되었습니까?

네. 확진 후
기침, 가래와 피로감이
4주 이상 계속 되었어요.





조사 결과는 어떠했나요?

코로나19 확진자 4~5명 중 1명은 '기침·가래', '피로감' 등의 증상이 4주 이상 지속되었고, 코로나19 예방접종자가 비접종자에 비해 4주 이상 증상 경험률이 낮게 나타났습니다.

구분	국민건강영양조사 (만1세 이상)	지역사회건강조사 (만19세 이상)
코로나19 확진자의 4주 이상 증상 경험률	확진자의 24.7% * 여자 30.7% > 남자 16.1%	확진자의 19.9% * 여자 24.7% > 남자 14.2%
4주 이상 증상 종류 (중복응답)	'기침, 가래', '피로감', '인후통' 순	'기침, 가래', '피로감', '인후통' 순
예방접종여부에 따른 4주 이상 증상 경험률	비접종자 44.8% > 접종자 30.0% * 만19세 이상 성인 대상 코로나19 백신 접종력 자료와 연계하여 분석	비접종자 23.4% > 접종자 19.7% * 조사대상자의 설문 응답결과 분석

※ 제시된 결과는 가중치, 연령표준화 등 적용하지 않은 잠정치임

※ 접종자는 코로나19 예방접종을 2차 이상('안센'의 경우 1차) 완료한 자, 비접종자는 코로나19 예방접종을 하지 않은 자

앞으로의 계획을 알려주세요!

코로나19 후유증 조사 관련 상세 분석 결과는 국가건강조사 분석보고서인 **'국민건강통계플러스'**와 **'지역건강통계 한눈에 보기'**를 통해 확인 할 수 있습니다. (4월말 발간 예정)

자세한 내용은 질병관리청 누리집 (<http://kdca.go.kr>)을 참고하세요.

