


의료인 대상

이부실드


(예방적 항체주사제)

자세히 알려드립니다



이부실드의 특성은 무엇인가요?


- ▶ 두개의 항체(틱사게비맵, 실가비맵)를 가진 항체 복합제로
- ▶ 백신의 효과를 기대할 수 없는 **중증면역저하자에게 투여 후 수시간 내 코로나19 감염예방효과**를 제공합니다. (최소 6개월간 효과 지속)



현재 유행하는 변이에 효과가 있나요?

➤ 이부실드는 현재 국내 유행 중인 BN.1과 BA.5 변이에 대해서도 감염예방효과가 유지되고 있습니다.



- 질병청은 오미크론 변이에 대한 중화능 감소를 고려하여 신규 투약용량을 2배 증량(300->600mg)하고, 기존 투약자에 대해 추가 투약을 실시 중('22.11월~)



이부실드 투약, 효과적이고 안전한가요?

효과성

- 이부실드 투약군은 백신 투약군에 비해 돌파감염률이 낮습니다.
- 또한, 이부실드 600mg 투약군은 300mg 투약군에 비해 더 낮은 돌파감염률을 보여주고 있습니다.



안전성

- 1만 여 명을 대상으로 한 임상시험에서 중대한 부작용은 보고되지 않았으며, 그 중에서도 두통, 피로, 기침과 같은 경미한 부작용이 대부분이었습니다.

누구에게 투약하나요?

- 투약 예정일 기준, 최근 7일 이내 코로나19 확진이력이 없고
- 만 12세 이상, 체중 40kg 이상인 사람 중
- 동종(자가)조혈모세포이식, CAR-T 치료, 장기이식환자, 일차면역결핍증 환자, HIV 환자, 고강도 항암치료 및 면역억제제 치료를 받는 환자

* 아래 (1)~(3) 조건 중 하나에 해당하는 경우

구분	세부 내용
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 최근 6개월 이내 동종(자가)조혈모세포이식, CAR-T 세포치료를 받은 환자 ➤ 최근 1년 이내 고형장기이식을 받은 환자 ➤ 일차면역결핍증 환자
2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ HIV 환자로 CD4세포수가 50/mm³ 미만으로 6개월 이내 200/mm³ 이상으로 회복하기 어려운 환자 ➤ 최근 1년간 평균 CD4세포수가 200/mm³미만인 경우 ➤ 지침 이외의 세포독성 항암제나 면역억제제로 치료 중인 환자 중 심각한 COVID-19로 진행될 가능성이 높다고 임상이가 판단하는 환자
3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 6개월 이내 고용량 코르티코 스테로이드 치료, 대사길항제, 칼시뉴린억제제, mTOR 억제제, infliximab, MMF 2주이상 투여, 항암제 치료를 받는 환자 ➤ 1년 이내 B-cell, T-cell therapy 받은 환자

얼마나 투약하나요?

➤ 신규 권장용량 : 600mg

- 틱사게비맵 300mg(2vial, 3.0ml), 실가비맵 300mg(2vial, 3.0ml)

➤ 기존 300mg 투약자에 대한 재투약방법

- 재투약일이 기존 투약일로부터 3개월 이하인 경우 300mg* 추가 투약 가능

* 틱사게비맵 150mg(1vial, 1.5ml), 실가비맵 150mg(1vial, 1.5ml)

- 재투약일이 기존 투약일로부터 3개월을 초과한 경우 600mg 추가 투약 가능



투약 절차는 어떻게 되나요?

예약 및 신청

- > 의료진(주치의)이 투약이 필요하다고 판단 시,
 코로나19예방접종등록시스템을 통해 대상자 등록 후
 예약 및 이부실드 신청

※ 단, 병원 내 재고물량 있을 시 당일투약 가능합니다.

투약방법

- > 한 주사기로 같은 종류의 두 바이알에서 총 3.0ml 추출
 * 틱사게비맵과 실가비맵은 서로 다른 주사기로 추출해야 함
- > 각 둔부 근육에 하나씩, 순차적으로 근육 내 주사 투약

투약력 입력

- > 투약 후 코로나19예방접종등록시스템에 투약력 입력


이부실드 투약 전 후, 코로나19 백신 접종은 어떻게 해야 하나요?

▶ 이부실드 투약 전 코로나19 백신을 접종 한 경우

↳ 백신 접종일로부터 14일 이후 이부실드 투약이 가능합니다.

▶ 이부실드 투약 후 코로나19 백신을 접종할 경우

↳ 이부실드 투약 후에는 별도 간격 없이 백신 접종이 가능합니다.



“

**중증면역저하자가 이부실드를 투약받아,
코로나19 감염 및 위중증 진행을 예방할 수 있도록
의료진 여러분의 적극적인 참여를 부탁드립니다.**

”

