

살처분 현장



보호구 탈의

전처리 공간(소독), 새 마스크 착용

통제선

보호구 착용

안전구역

- 휴식, 식사, (간이)화장실 -

함께 실천하는 건강한 생활!

## 조류인플루엔자(AI) 인체감염 예방요령

살처분 장소에서  
개인보호구 철저히 착용!  
개인보호구는 새롭게 현장에  
들어갈 때마다 교체합니다.

### 보건소의 증상 발생 확인 업무에 협조

- 살처분 작업 이후, 보건소에서 증상 발생 확인을 위한 연락 시 조사에 적극적으로 협조해주세요.
- 마지막 살처분 작업일 기준 5일, 10일째 연락할 예정이며, 증상 유무 관계없이 답변해 주세요.

### 살처분 후 증상 발생 시 주의사항

- 38℃ 이상의 발열, 근육통, 기침, 인후통 등 증상 발생 시 보건소 또는 1339에 즉시 알려주세요.
- 증상 발생 시 가족 등 다른 사람과의 접촉을 피해 주세요.
- 기침이나 재채기할 때 입과 코를 가려야 하고, 외출 시 마스크를 착용해주세요.
- 증상 발생 48시간 이내에, 보건소의 안내에 따라 항바이러스제를 처방받고 용법 및 용량에 맞게 복용하세요.



질병관리청

# 조류인플루엔자(AI) 인체감염 예방요령



확실한 준비로  
더 안전하게 작업할 수  
있습니다.

## 조류인플루엔자(AI)는 무엇입니까?

야생조류, 닭, 오리 등 조류에서 발생하는 인플루엔자로, 사람에게 감염되어 질병을 일으킬 수 있습니다.

## AI는 어떻게 사람에게 감염되나요?

- AI 바이러스는 감염된 조류, 분변, 오염된 물건을 접촉한 후 눈, 코, 입을 만졌을 때 감염될 수 있고, 드물지만 오염된 먼지의 흡입을 통한 감염도 가능합니다.
- 농장종사자, 살처분 참여자 등 AI 인체감염 고위험군은 보건당국의 지시에 따라 예방요령을 지켜주세요.



## 살처분 참여자 및 대응요원 주의사항

- 개인보호구를 철저히 착용하시고(개인 지참 모자는 탈의), 특히 개인보호구를 벗을 때 오염되지 않도록 주의해 주세요.
- 개인보호구는 살처분 현장에 들어가기 전에 입고, 새롭게 현장에 들어갈 때마다 교체합니다.
- 손소독제 등으로 손을 자주 씻습니다.
- 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입을 만지는 것을 피하세요.
- 작업 후 샤워를 합니다.
- 38°C 이상의 발열, 근육통, 기침, 인후통 등 증상 발생 시 보건소 또는 1339에 즉시 알려주세요.

# 보호구 입기 전 점검



물 한잔 마시기



화장실 다녀오기

## 개인보호구 입기



## 개인보호구 벗기

