

뎅기열 안내문



뎅기열이란?

- ▶ 뎅기바이러스에 감염된 숲모기에 물려 감염되며, 현재 예방백신 및 치료제는 없습니다.
- ▶ 전 세계 100여 개국에서 매년 1억명 이상 뎅기열에 감염되며, 국내에도 매년 해외 유입으로 지속 발생 중입니다.
- ▶ 뎅기열은 이집트숲모기와 흰줄숲모기에 의해 매개되며, 이 중 흰줄숲모기는 국내에 서식하고 있지만 뎅기바이러스는 검출되지 않았습니다.



〈이집트숲모기〉 열대·아열대 지역 도시에서 주로 서식
(사진출처 : 세계보건기구)



〈흰줄숲모기〉 북미, 유럽, 아시아 산림지역에서 주로 서식

뎅기열 증상은?

- ▶ 모기에 물린 후 5~7일 잠복기 후 갑작스런 고열, 두통, 발진, 근육통 등 증상이 나타납니다. 발진은 몸통, 손, 팔, 다리, 발 등에 나타납니다.
- ▶ 뎅기열 환자 중 약 5%는 중증 뎅기 감염증(뎅기쇼크나 뎅기출혈열 등)으로 진행되므로 사망위험을 줄이기 위해 빠른 진단 및 치료가 필요합니다.

뎅기열 예방수칙 4가지

1 	2 	3 	4
<p>여행전 국가별 감염병 예방수칙을 확인</p> <p>* 질병관리청 홈페이지에서 확인 가능 (감염병-해외감염정보-해외감염병NOW)</p>	<p>여행 중 모기예방물품 준비하여 활용</p> <p>모기퇴치를 위한 예방물품(기피제, 모기장, 밝은색 긴팔 및 긴바지 등)을 준비하여 사용</p>	<p>재감염이 되지 않도록 조심하기</p> <p>첫번째 감염과 다른 뎅기바이러스에 재감염되는 경우 중증뎅기감염증으로 진행될 수 있어 주의 필요</p>	<p>귀국후 2주 이내 의심증상 발생시, 의료기관 방문하고 치료받기</p> <p>의심증상 : 발열, 발진, 심한두통, 안외통증, 근육통, 관절통 등</p>