

발작성기침 백일해 알아보기



백일해는 백일해균에 의한 급성 호흡기 질환으로, 감염된 사람이 기침이나 재채기 등을 할 때 비말을 통해 전파가 가능하며, 유증상 감염자의 침, 콧물 등이 묻은 물건을 통해서도 간접적으로 전파가 가능합니다. **2024년에 특이적으로 10~19세가 전체 환자의 60% 이상**을 차지하고 있습니다.

국내 연도별 백일해 발생신고 건수 (질병관리청, 2024. 5. 13. 기준)

2021년	2022년	2023년	2024년
21명	31명	287명	510명

증상

잠복기	아급성기(카타르기) 가장 전염력 강한 시기	급성기(발작기)	회복기
			
5~21일 (평균 7~10일)	1~2주 콧물, 눈물, 기침	4주 이상 발작성 기침, "흠"하는 소리	2~3주 기침 서서히 감소

환자관리

① 백일해에 걸리면 전파 차단을 위해서 전염기간 동안 등교, 등원*을 중지하고 집에서 격리합니다.

***등교, 등원 중지기간**

적정 항생제 투여 시작 후 5일까지 격리
또는 치료를 받지 않을 경우 기침이 멈출 때 까지
최소 3주 이상 격리

② 백일해 환자와 접촉한 사람은 의료기관 방문하여 상담 후, 예방적 항생제 치료를 고려할 수 있습니다.



예방수칙



호흡기 증상 있으면
마스크 착용하고
진료받기



기침할 때는 옷소매로
입과 코를 가리기



비누로 30초 이상
올바른 손씻기



접종일정에 맞춘
예방접종하기