

 보건복지부 질병관리본부		<h1>보 도 참 고 자 료</h1>	
배 포 일	2018. 9. 28. / (총 6 매)	담당부서	예방접종관리과
과 장	공 인 식	전 화	043-719-6810
담 당 자	정 현 걸		043-719-6824

예방접종 용어변경 (정기 → 필수) 및 접종 후 부작용 관련 정보 제공 절차 신설

- 「예방접종의 실시기준 및 방법」 고시 개정하여 9월 28일 시행 -

- ◇ 그간 적기 접종을 의미했던 ‘정기’ 예방접종 용어를 국민의 건강보호를 위한 예방접종의 실천을 강조하기 위해 ‘필수’ 예방접종으로 변경
- ◇ 접종자 건강상태를 확인·기록하는 예진표에 접종 후 부작용 신고 등 관련 정보 수신 동의 절차를 신설해 보다 안전한 국가예방접종 사업 운영
- ◇ 질병관리본부는 지자체·의료계 및 국민대상 예방접종 실천, 부작용 관련 정보 동의 절차 등 적극 안내 협조 및 참여 독려 당부

□ 질병관리본부(본부장 정은경)는 예방접종의 중요성 인지와 실천 향상을 위해 ‘정기’예방접종에서 ‘필수’예방접종으로 용어를 변경하고 접종 후 부작용 관련정보제공 절차 신설을 주 내용으로 하는 「예방접종의 실시기준 및 방법」 고시 개정 사항을 9월 28일(금)부터 시행한다고 밝혔다.

□ 금번 「예방접종의 실시기준 및 방법」 개정의 주요 내용은 다음과 같다.

- ① ‘정기’예방접종에서 ‘필수’예방접종으로 용어 변경, 기존의 정해진 시기에 접종하는 것을 의미했던 용어를 예방접종 자체의 중요성을 강조해 실천을 독려하는 의미로 변경했다.

② 예진표*에 접종자의 보호자가 **접종 후 부작용 발생 관련 정보**를 수신하는 것에 대한 동의 절차를 신설, 이를 기반으로 부작용 발생시 신고, 처치, 보상 등에 관련된 정보를 휴대폰 문자**를 받을 수 있도록 해, 보다 안전한 국가예방접종사업 운영이 가능해졌다.

* 예진표는 의사가 문진을 통해 접종 전 접종자의 건강 상태를 체크하는 문서로 모든 예방접종 전에 시행

** 기존의 정보 제공 : 접종시기 도래 직후, 접종시기 1개월 지연 직후 해당 백신의 접종 정보를 개별 안내하였음 → 금번 개정으로 접종 후 부작용 관련 정보 추가 제공이 가능

③ B형 간염 산모로부터 출산 과정에서 일어나는 **신생아 B형 간염 전파**를 보다 효율적으로 차단하기 위해 산모의 B형 간염 보균여부를 모르는 경우, 출생 후 12시간 내에 신속하게 신생아 접종을 실시하도록 그 접종시기를 명확히 했다.

□ 질병관리본부 공인식 예방접종관리과장은 “최근 국내외로 예방접종에 대한 잘못된 정보를 제공하는 인터넷 활동이 급증하며 예방접종을 거부·지연하는 보호자들이 생겨, 미국 캘리포니아, 유럽 루마니아, 이탈리아 등 홍역 유행의 사례와 같이 낮은 접종률로 인한 재유행이 우려된다.”고 밝혔다.

○ “금번 ‘필수’예방접종 용어 변경과 부작용 정보제공의 근거를 마련한 것은 보호자의 아이 건강 보호에 대한 책임을 강화하면서 국가의 예방접종 안전 관리 체계를 보강한 것으로 의미 있다.”고 덧붙였다.

<붙임> 1. 예방접종 실시 기준 및 방법, 별지 제1호 서식, 예방접종 예진표 (개정)
2. 「예방접종의 실시기준 및 방법」 신·구문 대조표

붙임 2

「예방접종의 실시기준 및 방법」 신·구문 대조표

현행	개정
<p>제2조(적용대상) 예방접종 적용대상 감염병은 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. 법 제24조제1항의 제1호 내지 <u>제14호</u>에 규정된 디프테리아, 폴리오, 백일해, 홍역, 파상풍, 결핵, B형간염, 유행성이하선염, 풍진, 수두, 일본뇌염, b형헤모필루스인플루엔자, 폐렴구균, 인플루엔자</p> <p>2. 법 제24조제1항 <u>제15호</u>에 따라 「정기예방접종이 필요한 감염병 지정 등」 제1조에 규정된 장티푸스, 신증후군출혈열, A형간염, 사람유두종바이러스 감염증</p>	<p>제2조(적용대상) 예방접종 적용대상 감염병은 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. 법 제24조제1항의 제1호 내지 <u>제16호</u>에 규정된 디프테리아, 폴리오, 백일해, 홍역, 파상풍, 결핵, B형간염, 유행성이하선염, 풍진, 수두, 일본뇌염, b형헤모필루스인플루엔자, 폐렴구균, 인플루엔자, <u>A형간염, 사람유두종바이러스 감염증</u></p> <p>2. 법 제24조제1항 <u>제17호</u>에 따라 「<u>필수</u>예방접종이 필요한 감염병 지정 등」 제1조에 규정된 장티푸스, 신증후군출혈열</p>
<p>제3조(예방접종의 실시 등) ①~③ (생략)</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 보건의료기관과 의료인은 예방접종의 중요성, 접종시기, 접종으로 예방할 수 있는 감염병, 예방접종내역의 기록 및 보관의 중요성 및 <u>정기</u>·임시 예방접종과 기타 예방접종의 차이에 대한 교육·홍보</p>	<p>제3조(예방접종의 실시 등) ①~③ (현행과 같음)</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. 보건의료기관과 의료인은 예방접종의 중요성, 접종시기, 접종으로 예방할 수 있는 감염병, 예방접종내역의 기록 및 보관의 중요성 및 <u>필수</u>·임시 예방접종과 기타 예방접종의 차이에 대한 교육·홍보</p>
<p>제4조(주의사항 등) ①~③ (생략)</p> <p>④ <u>정기</u> 및 임시예방접종을 실시한 자는 법 - -----신고한다.</p>	<p>제4조(주의사항 등) ①~③ (현행과 같음)</p> <p>④ <u>필수</u> 및 임시예방접종을 실시한 자는 법 - -----신고한다.</p>
<p>[별표 1]</p> <p>① 결핵</p> <p>○ 접종대상</p> <ul style="list-style-type: none"> • 모든 영유아를 대상으로 한다. <p>○ 표준접종시기</p> <ul style="list-style-type: none"> • 생후 1개월 이내에 <u>접종</u>을 권장한다. <p>○ 백신종류: BCG(피내용)</p>	<p>[별표 1]</p> <p>① 결핵</p> <p>○ 접종대상</p> <ul style="list-style-type: none"> • 모든 영유아를 대상으로 한다. <p>○ 표준접종시기</p> <ul style="list-style-type: none"> • 생후 1개월 이내에 <u>1회</u> 접종을 권장한다. <p>○ 백신종류: BCG(피내용)</p>

현행	개정
<p>② B형간염</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 접종대상 <ul style="list-style-type: none"> • 모든 영유아를 대상으로 한다. • HBsAg과 anti-HBs 검사 결과가 모두 음성인 성인 중에서는 B형간염 바이러스에 노출될 위험이 높은 환경에 있는 사람이 대상이다. 특히, 다음에 해당하는 성인은 우선 접종권장 대상이 된다. <ol style="list-style-type: none"> ① B형간염 바이러스 보유자의 가족 ② 혈액제제를 자주 수혈 받아야 되는 환자 ③ 혈액투석을 받는 환자 ④ 주사용 약물 중독자 ⑤ 의료기관 종사자 ⑥ 수용시설의 수용자 및 근무자 ⑦ 성매개질환의 노출 위험이 큰 집단 <ul style="list-style-type: none"> ○ 표준접종시기 <ul style="list-style-type: none"> • 모체가 HBsAg 양성인 경우 : HBIG 및 B형간염 1차 접종을 생후 12시간 이내 각각 다른 부위에 실시할 것을 권장한다. • 모체가 HBsAg 음성인 경우 : 생후 1~2개월에 B형간염 접종을 시작할 것을 권장한다. 	<p>② B형간염</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 접종대상 <ul style="list-style-type: none"> • 모든 신생아 및 영아를 대상으로 한다. • 과거 B형간염의 감염증거와 예방접종력이 없는 성인 중 B형간염 바이러스에 노출될 위험이 높은 환경에 있는 사람을 우선 접종 권장 대상으로 한다. <p>①~⑦ (현행과 같음)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 표준접종시기 <ul style="list-style-type: none"> • 생후 0, 1, 6개월에 3회 접종할 것을 권장한다. • 다만, 모체의 B형간염 표면항원 결과가 양성이거나 검사결과를 알지 못하는 경우 아래와 같이 접종할 것을 권장한다. <hr/> <p>① 모체가 B형간염 표면항원 양성인 경우:</p> <p>B형간염 면역글로블린 및 B형간염 백신 1차 접종을 출생 직후(12시간 이내) 각각 다른 부위에 실시할 것을 권장한다. 2, 3차 접종은 생후 1, 6개월에 실시한다.</p> <hr/> <p>② 모체의 B형간염 표면항원 검사 결과를 알지 못하는 경우 : B형간염 백신 1차 접종을 출생 직후 (12시간 이내)에 실시하고, 모체의 검사 결과가 양성으로 밝혀지면 가능한 빠른 시기(늦어도 7일 이내)에 B형간염 면역글로블린을 백신접종과 다른 부위에 접종한다. 이후 B형간염 2차와 3차 접종은 생후 1, 6개월에 실시한다.</p>

현행	개정
③~⑥ (생략)	③~⑥ (현행과 같음)
<p>⑦ 장티푸스</p> <p>○접종대상</p> <ul style="list-style-type: none"> • 다음의 대상자 중 위험요인 및 접종환경 등을 고려하여 제한적으로 접종할 것을 권장한다. <p>① 장티푸스 보균자와 밀접하게 접촉하는 사람(가족 등)</p> <p>② 장티푸스가 유행하는 지역으로 여행하는 사람 및 체류자</p> <p>③ 장티푸스 균을 취급하는 실험실 요원</p> <p>○표준접종시기</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Vi polysaccharide</u> 백신을 접종하는 경우 3년마다 접종하고 2세 미만의 영아는 권장하지 않는다. 	<p>⑦ 장티푸스</p> <p>○(현행과 같음)</p> <p>○표준접종시기</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Vi polysaccharide</u> 백신을 1회 접종하고 장티푸스에 걸릴 위험에 계속 노출되는 경우에는 3년마다 추가접종 할 것을 권장한다. • 2세 미만의 영아는 권장하지 않는다.
⑧~⑬ (생략)	⑧~⑬ (현행과 같음)
<p>⑭ 사람유두종바이러스 감염증</p> <p>○접종대상</p> <ul style="list-style-type: none"> • 해당 연도에 만 12세 이거나 만 12세에 달하게 되는 여아를 대상으로 한다. <p>○표준접종시기</p> <ul style="list-style-type: none"> • 만 12세에 1차 접종 후 6개월 뒤에 2차 접종할 것을 권장한다. 	<p>⑭ 사람유두종바이러스 감염증</p> <p>○(현행과 같음)</p> <p>○표준접종시기</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>사람유두종바이러스</u> 백신(2가 또는 4가)으로 만 12세에 1차 접종 후 6개월 간격으로 2차 접종할 것을 권장한다.