

2023년 3월 6일부터

로타바이러스

무료 예방접종 실시!



로타바이러스란?

- 영유아에서 흔하게 감염성 설사질환을 유발하는 바이러스로, 겨울철에서 봄철까지 주로 발생합니다.
- 바이러스로 오염된 대변이 손에 묻어 입을 통해 감염되거나, 식품·주방기구·젖병·장난감·오염된 물 등 매개물을 통해 바이러스가 전파될 수 있어 주의가 필요합니다.

사업안내

사업대상 생후 2개월~6개월 영아

지원백신 로타릭스 2회, 로타텍 3회

접종방법 경구투여

접종기관 지정의료기관* 및 보건소

* 예방접종도우미누리집에서 확인가능

주의사항 ①생후 15주가되기 전 첫 번째 접종 완료 ②생후 8개월이 되기 전 모든 접종 완료

※ 자세한 사항은 예진의사와 상담

Q.

로타바이러스 예방접종, 왜 필요한가요?



A. 로타바이러스는 영유아에게 쉽게 퍼질 수 있고
감염되면 **심한 설사, 구토, 발열, 복통**을 일으키기 때문에
예방접종이 필요한 질병입니다.



- ① 완전접종(필요한 접종횟수 완료) 시 로타바이러스 감염증 발생률 3배 감소
[자료 출처: 영유아로타바이러스 백신 접종과 로타바이러스 감염증의 연관성 연구, 2022]
- ② 예방접종 시 로타바이러스 질환으로 인한 입원으로부터 90% 이상 보호
[자료 출처: CDC, 2021]

Q.

로타바이러스 예방접종, 안전한 건가요?



A. 로타바이러스 백신은 전세계 114개국이 도입한 백신으로 로타릭스, 로타텍 2가지 백신 모두 안전하고 효과적인 것으로 밝혀졌습니다.



로타바이러스 백신은
OECD 가입 38개국 중 24개국에서
국가예방접종 도입



로타바이러스 백신(로타릭스, 로타텍)
모두 대규모 임상 시험에서
안전하고 효과적으로 밝혀짐
(자료출처 : WHO, CDC)

로타바이러스 예방접종에 대해 더 알고 싶다면?

<https://nip.kdca.go.kr>

로타 바이러스 내용부터
접종기관까지!

