

# 호흡기세포융합바이러스 감염증 알아보기 🔍



Q1

# 호흡기세포융합바이러스 감염증은 무엇인가요?



- ▶ 일반적으로 감기와 유사한 증상을 나타내는 급성 호흡기감염 바이러스로 원인병원체는 **호흡기세포융합바이러스(RSV)** 입니다.

\* RSV, respiratory syncytial virus

- ▶ 모든 연령대에서 발생할 수 있으나, 특히 1세 미만 영아에게 나타나는 폐렴 등 하기도 감염의 가장 흔한 원인으로 지목되고 있습니다.

## Q2

# 호흡기세포융합바이러스 감염 증상은 무엇인가요?



- ▶ 호흡기세포융합바이러스 감염증에 감염된 경우 일반적으로 감염 후 4~6일 이내 증상이 나타납니다.
- ▶ 성인은 기침, 콧물, 코막힘 등 가벼운 감기증상이 나타나지만, 신생아나 영유아의 경우 호흡기 증상 없이 보챔, 쳐짐, 수유량감소, 빠르고 쉼쉼거리는 숨소리(천명음), 무호흡(10초이상) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- ▶ 특히 신생아 및 영유아는 세기관지염이나 폐렴 등으로 진행될 수 있어 주의가 필요합니다.

## Q3

# 호흡기세포융합바이러스 감염증은 어떻게 전파되나요?



- ▶ 감염된 사람의 기침, 재채기 등 호흡기 비말을 통해 전파되며,
- ▶ 감염된 사람의 분비물 또는 바이러스에 오염된 물건을 접촉한 후 눈, 코, 입 주위등을 만졌을때 감염될 수 있습니다.
- ▶ 특히 집단생활을 하는 산후조리원, 어린이집, 유치원 및 요양기관 등에서 철저한 예방과 관리가 필요합니다.

## Q4

# 호흡기세포융합바이러스 감염증의 치료방법은 무엇인가요?



- ▶ 일반적으로 해열제 투약, 수액 치료 등 대증요법으로 치료합니다.
- ▶ 단, 세기관지염이나 폐렴 등 하기도 감염으로 진행된 경우 입원 치료가 필요합니다.



Q5

# 호흡기세포융합바이러스 감염증은 어떻게 예방할까요?



30초 이상  
흐르는 물에 손씻기



씻지 않은 손으로  
눈, 코, 입을 만지지 않기



호흡기증상이 있는 사람과  
접촉 피하기



장난감, 식기 등 많이 만지는  
물건 자주 소독하기



기침할때  
입과 코 가리기



아프면 집에서 쉬기