

아이 건강도 지키고,
비용 부담도 줄이고!



로타바이러스 백신 무료 접종

#로타바이러스백신무료접종

영유아 감염이 많은 로타바이러스

로타바이러스는 감염성 설사 질환을 유발하는 바이러스로
흔히 영유아에게서 감염증이 발생합니다.

감염경로 대변 접촉에 의해 손에서 입으로 감염되거나
식품, 젖병, 장난감, 주방기구, 오염된 물 등의
매개물을 통한 간접적 전파로 감염

잠복기 약 2일

주요 감염증상



심한 설사



구토



발열



복통

로타바이러스 예방접종 꼭 해야 할까?

로타바이러스는 영유아에게서 쉽게 확산되므로
집단감염 등의 예방을 위해 예방접종이 권고됩니다.

로타바이러스 백신 완전접종 시
로타바이러스 감염증 발생률이 3배 감소할 뿐 아니라
로타바이러스 질환으로 인한 입원을
90% 이상 방지할 수 있습니다.



로타바이러스 백신 믿고 접종해도 될까?

로타바이러스 백신은 전 세계 114개국에 도입한 백신으로
로타릭스, 로타텍 2가지 백신 모두 안전성 및 효과가 입증됐습니다.



로타바이러스 백신은
OECD 가입
38개국 24개국에서
국가예방접종 도입



로타바이러스 백신
(로타릭스, 로타텍)
모두 대규모 임상 시험을
통해 안정성 및 효과 입증

로타바이러스 백신 무료 접종 대상 및 방법

접종대상 생후 2~6개월 영아 **지원백신** 로타릭스 2회, 로타텍스 3회
접종방법 경구투여 **접종기관** 지정의료기관 및 보건소

* 지정의료기관은 예방접종도우미누리집에서 확인 가능

구분	1가 백신(로타릭스)	5가 백신(로타텍)
접종 횟수	2회	3회
표준접종일정	생후 2, 4개월	생후 2, 4, 6개월
최소 접종 연령(1차) ¹⁾	생후 6주	생후 6주
최대 접종 시작 연령(1차) ²⁾	생후 14주 6일	생후 14주 6일
최소 접종 간격	4주	4주
접종가능 최대 연령 ³⁾	생후 8개월 0일	생후 8개월 0일

^{1) 2)} 접종을 처음 시작할 수 있는 최소, 최대 연령을 말한다.

³⁾ 접종가능 최대연령 이후에는 로타바이러스 백신을 접종하지 않는다.



접종 대상자 중
금기 및 주의사항에 해당하는
경우가 있을 수 있어

로타바이러스 예방접종 시
아기의 건강 상태를 고려해
반드시 의사와 상담 후 진행하세요.