



유행성 이하선염 (볼거리)

KMA
대한의사협회

유행성 이하선염 정의 및 원인

Epidemic Parotitis



볼거리라고도 부르는 유행성 이하선염은 바이러스(Mumps virus)로 인해 발생하는 감염성 바이러스 질환으로 한 번 감염된 뒤에는 면역이 형성되지만, 매우 드물게 재감염될 수 있음

침, 기침, 재채기 등으로 인한 호흡기 비말(미세 침방울)이 주된 전파 경로이며, 오염된 타액과의 직접 접촉 또는 물건을 통한 간접 접촉으로도 전파 대부분 4~12세 어린이가 감염되며, 면역이 없는 청소년 또는 성인도 감염될 수 있음

유행성 이하선염 증상

Symptom

바이러스 감염 후 약 15일의 잠복기를 거쳐 증상 발생
감염 환자의 약 20%는 증상이 없는 특징

초기증상

- 발열, 두통, 근육통, 식욕 부진, 구토, 권태감 등
- 1~2일 정도 증상 발생

침샘염

- 한쪽 또는 양쪽 귀밑 침샘이 단단해지고, 붓기 시작하며 통증 발생
- 1주 정도 증상 발생, 약 10일 후 회복
- 감염 환자의 약 30~65%에서 발생



합병증

- 수막염, 뇌염, 청력 장애, 고환염, 난소염, 췌장염, 심근염 등

유행성 이하선염 치료

Treatment

대부분 자연스럽게 회복되므로
증상 완화를 위해 대증 요법을 시행

다른 감염 질환, 통증 등에 따라
항생제와 진통제가 사용될 수 있으며,
온찜질 또는 냉찜질을 해주면
통증, 부종 완화에 도움

음식은 턱 사용을 최소화할 수 있는
국물이 있는 부드러운 음식이 좋고,
반대로 신맛이 나는 음식은
침샘을 자극해 통증을 악화시키기 때문에
피하는 것이 좋음



유행성 이하선염 예방 방법

MMR(홍역, 볼거리, 풍진)
혼합 백신의 접종을 통해 예방 가능

감염 환자는 증상 발현 3일 전부터 발현 후 5일까지는
바이러스를 전파할 수 있어 등원 및 등교를 제한

대상	예방 접종 횟수	예방 접종 시기
소아	총 2회	<ul style="list-style-type: none">• 생후 12~15개월• 4~6세
청소년, 성인	최소 1회 이상	<ul style="list-style-type: none">• 과거 백신 접종 기록이 없고, 감염병에 걸린 적이 없거나 항체가 확인되지 않은 경우• 청소년, 대학생, 직업교육원생, 의료종사자, 해외여행자는 1차 접종일 최소 4주 후 2차 접종 시행



유행성 이하선염은
매년 봄에 환자가 증가하는 질환으로
한 명만 걸려도 집단 유행으로 번질 수 있는데요.

비누를 사용해 30초 이상 손 씻기,
기침이나 재채기는 휴지나 옷소매로 입과 코를 가리기 등
철저한 개인위생을 통해 예방하는 것이 중요합니다.

증상이 있다면
신속히 의료기관을 방문해
치료받으시길 바랍니다.