


우리 아이 입 그리고 손과 발에  
**물집이 생겼다면?!**


# 수족구병



# 수족구병이란?

콕사키 바이러스가 일으키는  
바이러스성 질환으로, 입과 손, 발에  
수포성 발진 증상이 발생합니다.

주로 4세 이하 소아에게 발병하기 쉬우며,  
전염성이 강하고 초기 증상이 심해  
각별한 주의가 필요합니다.




# 초기 증상

## 발진과 수포



## 전신증상



발열, 무력감,  
식욕감소

## 위장증상



설사, 구토



\* 입 안쪽의 수포로 음식을 먹는 것이 어려울 수 있으므로,  
아이가 음식 섭취, 물 마시기를 힘들어 한다면 수족구병을 의심해 보세요.

# 시기별 증상

✓ **잠복기**      접촉 후 3~7일

✓ **초기 증상**(2~3일)      손등, 발등, 입가에 물집 발생,  
발열, 음식거부 등

✓ **중기 증상**(3~4일)      발진 및 수포 호전

✓ **말기 증상**(7~10일)      대부분 회복

\* 초기증상이 나타나면, 증상 완화 및 치료를 위해  
병원 진료를 권장합니다.



# 감염경로 및 예방법

## 감염경로



감염자의 호흡기 분비물  
(침, 가래, 콧물 등)



감염자의  
대변



물집의  
진물

## 예방법




올바른 손씻기를  
생활화



장난감, 놀이기구, 집기 등  
청결 유지



수족구병이 의심될 경우  
바로 병원 진료



# 수족구병은 예방과 초기 증상 발견이 중요합니다.

증상이 발견된다면, 다른 사람들과의 접촉을 피하고  
빠르게 병원을 방문해주세요.

