

2023 - 2024절기

임신부 인플루엔자 예방접종 안내문

한번의 예방접종으로
엄마와아기모두 지켜요!



2023-2024절기 임신부 인플루엔자 국가예방접종 지원 안내

- 지원대상** 임신 여부를 확인한 임신부 (산모수첩 등 소지)
* 임신 주수에 상관없이 접종 가능
- 지원기간** 2023.10.5.(목) ~ 2024.4.30.(화)
- 접종기관** 지정의료기관 및 보건소
* 예방접종도우미 누리집에서 확인 가능 (보건소는 방문 전 확인 필수)
- 지원내용** 인플루엔자 4가 예방접종 1회



임신부에게 인플루엔자 예방접종은 왜 필요한가요?

- 임신부는 인플루엔자에 감염되면 폐렴 등 합병증 발생 위험이 일반인보다 높아 예방접종이 꼭 필요합니다.
- 임신부가 인플루엔자에 감염되면 사산, 조산이나 저체중아 출산 등의 위험도 높아집니다.
- 임신 중 인플루엔자 예방접종을 하면 태아에게 항체를 전달하여 출생한 신생아의 인플루엔자 감염 예방에 도움을 줄 수 있습니다.

따라서 전문가들은 임신부에게 임신 주수에 상관없이 인플루엔자 접종을 우선 권고합니다.



임신부 인플루엔자 예방접종, 안전한가요?

- 네, 안전합니다
세계보건기구(WHO), 미국, 호주, 영국, 뉴질랜드 등에서도 임신부에게 인플루엔자 예방접종을 권고하고 있습니다.

예방접종도우미
바로가기 >>>



검색하기
예방접종도우미

검색창에 '예방접종도우미'를
검색해주세요.



바로가기 QR코드 스캔
<https://nip.kdca.go.kr/>

X 이런 분들은 예방접종을 해서는 안됩니다!

- ❖ 과거 인플루엔자 백신 접종후 중증(생명에 위협적인) 알레르기 반응이 있었던 경우
- ❖ 인플루엔자 백신 성분에 중증 알레르기 반응이 있었던 경우


! 이런 분들은 예방접종에 주의해야 합니다!

- ❖ 인플루엔자 백신접종 후 6주 이내 길랭-바레 증후군의 과거력이 있는 사람
- ❖ 중등증 또는 중증 급성질환자는 증상이 호전될 때까지 접종 연기

! 예방접종 전·후 주의사항

- ❖ 예방접종 전 반드시 **의사의 예진**을 받아야 합니다.
- ❖ 건강 상태가 좋은 날 가까운 의료기관에 예방접종이 가능한지 **사전 확인 후 방문**합니다.
- ❖ 예방접종 전, **아픈 증상이 있거나 만성질환**이 있다면 반드시 의사와 상담해야 합니다.
- ❖ 접종 후 20~30분간 접종기관에 머물면서 급성 **이상반응 발생 여부**를 관찰한 뒤 귀가합니다.
- ❖ 접종 부위는 **청결하게 유지**합니다.
- ❖ 접종 후 2~3일간은 **고열 등 평소와 다른 신체 증상**이 나타나면 반드시 의사의 진료를 받도록 합니다.

예방접종을 위해 의료기관 방문 시 행동수칙




1 보호자와 접종대상자 모두 마스크 착용



2 손소독 등 개인위생 수칙 준수



3 대상자, 보호자는 **코로나19 증상** 있을 시 **방문 전 알리기**



4 접종 후 현장에서 **20~30분** 머무르며 **이상반응 관찰** 후 귀가

! 인플루엔자 예방접종 후 이상반응

예방접종 후 발생가능한 이상반응

- ❖ **국소 이상반응** : 접종부위가 빨갱게 부어오름, 통증
- ❖ **전신 이상반응** : 발열, 무력감, 근육통, 두통 등

예방접종 후 이상반응이 생기면

경미한 이상반응은 예방접종 후 나타날 수 있으며, 2~3일 이내 호전됩니다.
다만, 증상이 심해지거나 장시간 지속되는 경우, 그 밖에 다른 증상이 나타나는 경우 의사의 진료를 받도록 합니다.

예방접종 후 이상반응이 발생하면 보건소 및 의료기관을 통해 신고하실 수 있습니다.
『예방접종피해 국가보상제도』를 운영하고 있으니 주소지 관할 보건소로 문의하시기 바랍니다.