

대구광역시 감염병 소식지



제 22-14호 16주 발행일 2022. 4. 20.(수) 발행처 대구광역시 감염병관리지원단(www.daegucidcp.kr) 전화 053-429-7990

야외활동이 증가하는 시기에 특히 조심해야 할 중증열성혈소판감소증후군

(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome, SFTS)

중증열성혈소판감소증후군바이러스 감염에 의한 질환



감염경로


- 주로 중증열성혈소판감소증후군바이러스에 감염된 참진드기*에 물려서 감염
- SFTS 환자와 SFTS에 감염된 동물의 혈액 및 체액에 직,간접 노출되어 감염
- * 국내에는 '작은소피참진드기'가 주요 매개종임

잠복기

- 4~15일

증상

- 38℃ 이상의 고열, 소화기 증상(구토, 설사, 식욕부진 등) 등



치료

- 증상에 따른 대증적 치료(현재까지 백신과 치료제가 없음)

예방

- ① 진드기에 물리지 않도록 주의하기
- ② 야외활동 시
 - 풀밭 위에 옷을 벗어두지 않기, 용변 보지 않기
 - 돛자리 사용하고 사용 후 세척해서 햇볕에 말리기
- ③ 야외활동 후
 - 옷을 털고 세탁하기, 샤워·목욕하기
 - 몸에 진드기가 붙어 있는지 꼼꼼히 확인하기

최선의 예방법



진드기에 물렸을 때

- 의료기관에 내원하여 진드기를 제거 받거나, 내원이 어려운 경우에는 진드기 제거법**에 따라 진드기를 제거하고, 해당 부위를 소독하기

** 올바른 진드기 제거법

- 핀셋 등을 이용하여 진드기 머리 부분을 잡고 수직으로 세위 조심스럽게 떼어내고 진드기 머리카락이 피부에 박혀있는지 확인하기
- 이후 15일 동안 발열, 구토, 설사 등 증상이 나타나는지 주의 깊게 관찰하며,
- 증상이 나타나면 즉시 의료기관을 방문하여 진료 받기

